6. 中国東北部大豆遺伝資源の特性とその遺伝的多様性

[要約] 中国吉林省農業科学院大豆研究所で保存している中国東北部の大豆遺伝資源のうち、調査した計 3,012 点の主要形質に関するデータベースを構築した。中国東北部大豆遺伝資源は、日本の大豆と DNA レベルでも大きく異なり、また遺伝的多様性に富んでいる。

所属	国際農林水産業研究センター・生物資源部			連絡先	029(838)6305		
推進会議名	国際農林水産業	専門	遺伝資源	対象	だいた	分類	研究

[背景・ねらい]

中国東北部は大豆の起源地の 1 つとされており、多様性に富んだ多くの大豆遺伝資源を有している。しかしながら、吉林省農業科学院大豆研究所が保有する多数の大豆遺伝資源の特性評価については十分な研究蓄積がない。そこで、これら遺伝資源を有効に活用するため、主要特性の評価によるデータベースの作製と分子遺伝学的手法による分類・評価を行う。

[成果の概要・特徴]

1. 作成した大豆遺伝資源に関するデータベースは、2001 年～2003 年の 3 年にわたり、吉林省農業科学院大豆研究所において同一栽培条件下（畦間 65cm、株間 8cm、1 株 1 本立）で栽培した計 3,012 点の大豆品種・系統の調査結果で構成される。
2. データベース化された主要形質は、出芽期、開花期、成熟期、伸育性、葉型、花色、毛茸色、主茎長、種子粒形、種皮色、子葉色、種子蛋白質含量、種子脂質含量、百粒重の 14 形質であり、多くの形質について多様な変異が認められる（表 1）。
3. 中国東北部大豆遺伝資源の 194 品種に対する 12 の DNA マーカーによる分析結果から、中国東北部の大豆遺伝資源は日本国内の大豆と DNA レベルで大きな差異を示し、かつより遺伝的多様性に富んでいることが分かる（図 1）。
4. 12 の DNA マーカーを用いて日中品種計 244 点を分類できたので、これを多数の遺伝資源の品種同定に利用できる。[成果の活用面・留意点]

[成果の活用面・留意点]

1. 評価した大豆遺伝資源は、主に吉林省を中心に黒竜江省、遼寧省など中国東北部原産であるが、一部その他の地域の育成品種・在来種も含んでいる。
2. 主要大豆形質についてのデータベースは公開に向けて準備中である。

[具体的データ]

表 1 中国東北部大豆遺伝資源の主要特性

供試年	供試数	生育日数	伸育性	葉型	花色	毛茸色	主茎長 (cm)	種子粒形	種皮色	子葉色	蛋白質含量 (%)	脂質含量 (%)	百粒重 (g)
2001年	1012	平均: 115.3	有: 159	円: 942	紫: 564	褐: 194	平均: 95.1	球: 328	黄: 756	黄: 977	平均: 42.5	平均: 19.2	平均: 18.5
		レンジ: 50-132	半: 126	長: 70	白: 448	白: 813	レンジ: 7-277	楕円: 468	黄白: 111	緑: 32	レンジ: 11.5-59.4	レンジ: 10.3-23.6	レンジ: 5.3-34.2
		標偏: 10.1	無: 727			無: 5	標偏: 33.4	他: 216	他: 145	他: 3	標偏: 2.75	標偏: 1.50	標偏: 3.78
2002年	1500	平均: 123.9	有: 207	円: 1193	紫: 644	褐: 232	平均: 82.3	球: 384	黄: 1059	黄: 1384	平均: -	平均: -	平均: 18.4
		レンジ: 67-151	半: 464	長: 307	白: 856	白: 1267	レンジ: 12-197	楕円: 880	黄白: 151	緑: 116	レンジ: -	レンジ: -	レンジ: 4.9-46.0
		標偏: 13.2	無: 829			無: 1	標偏: 21.0	他: 236	他: 290	他: 0	標偏: -	標偏: -	標偏: 4.1
2003年	500	平均: 122.0	有: 27	円: 440	紫: 141	褐: 30	平均: 77.4	球: 158	黄: 192	黄: 258	平均: 42.7	平均: 18.0	平均: 20.7
		レンジ: 82-149	半: 214	長: 60	白: 358	白: 470	レンジ: 16-121	楕円: 311	黄白: 31	緑: 242	レンジ: 37.4-47.5	レンジ: 14.1-23.0	レンジ: 7.5-42.2
		標偏: 16.1	無: 258	混: 1			標偏: 15.7	他: 31	他: 277	他: 0	標偏: 1.60	標偏: 1.59	標偏: 5.53
計	3012	平均: 120.7	有: 393	円: 2575	紫: 1349	褐: 456	平均: 85.8	球: 870	黄: 2007	黄: 2619	平均: 42.6	平均: 18.8	平均: 18.8
		レンジ: 50-151	半: 804	長: 437	白: 1662	白: 2550	レンジ: 7-277	楕円: 1659	黄白: 293	緑: 390	レンジ: 11.5-59.4	レンジ: 10.3-23.6	レンジ: 4.9-46.0
		標偏: 12.9	無: 1814	混: 1	無: 6	標偏: 26.1	他: 483	他: 712	他: 3	標偏: 2.43	標偏: 1.63	標偏: 4.34

図 1 12 の DNA マーカーの遺伝子型を基にクラスター分析によって得られた日中大豆遺伝資源の類縁関係

[その他]

研究課題: 中国における大豆の遺伝資源の特性評価と新品種素材の開発

予算区分: 国際プロ [中国食料資源]

研究期間: 2003 年度 (2001 ~ 2003 年度)

研究担当者: 山中直樹、岡部昭典 (近中四農研)、楊振宇 (吉林省農科院大豆研究所)、楊光宇 (吉林省農科院大豆研究所)、坂智広、足立大山

発表論文等:

- 1) 山中直樹、佐藤宏行、楊振宇、許東河、足立大山、坂智広 (2003): SSR マーカーを利用した中国東北部大豆遺伝資源の多様性評価、育種学研究、第 5 巻別冊 1 号、221 頁
- 2) 岡部昭典、楊春明、楊光宇、菊池彰夫、猿田正恭 (2003): 中国東北部におけるダイズ遺伝資源の特性評価、育種学研究、第 5 巻別冊 1 号、236 頁
- 3) 楊光宇、足立大山、岡部昭典 (2001): 吉林農業科学 (4) 6-13 頁
- 4) 品種登録: 楊光宇、劉凱、王洋、廖林、劉玉芝、楊振宇、王曙明、馬曉萍、閻曉燕、胡金海、許明、王曉東、孫大敏、劉玉芳、富健、足立大山、岡部昭典 (2001): 吉育 55 号 (吉審豆 2001002)、吉育 57 号 (吉審豆 2001007)、吉育 58 号 (吉審豆 2001001)、吉育 59 号 (吉審豆 2001006)
- 5) 品種登録: 廖林、劉玉芝、楊振宇、張鉄柱、越国輝、山中直樹、閻曉燕 (2003): 吉育 68 号 (吉審豆 2003013)、吉育 71 号 (吉審豆 2003015)